



NEDERLAND

Ter inzage gelegde

Octrooiaanvraag No. 6501367

Klasse 124 hc 5 b 7 c 1 + b 2 a 1 + 2.

I. P. C. C 07 d (A 61 k 3/00).

Indieningsdatum: 3 februari 1965, Datum van terinzagelegging: 4 augustus 1965.
24 uur.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werden ingediend.

Aanvrager: Merck & Co., Inc.,
te RAHWAY, New Jersey, Ver. St. van Amerika.

Gemachtigde: Nederlandsch Octrooibureau (Ir. N. Rusting, Dr. J. G. Frielink
en Ir. G. F. van der Beek), Zwarteweg 5, 's-Gravenhage.

Ingeroepen recht van voorrang: 3 februari 1964 (No. 342,221)
(Ver. St. van Amerika)

Korte aanduiding: Werkwijze voor het bereiden van heterocyclische stikstof-
verbindingen.

De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op de bereiding van nieuwe organische verbindingen en meer in het bijzonder op de bereiding van nieuwe bicyclische stikstofverbindingen, namelijk 1,3-ethanopiperazine en de N-alkyl- en N-acylderivaten hiervan, uit gemakkelijk verkrijgbare organische verbindingen, terwijl de uitvinding bovendien betrekking heeft op de bereiding van nieuwe heterocyclische stikstofverbindingen, die als tussenprodukten bij de bereiding van de genoemde stoffen worden gebruikt.

Volgens de uitvinding wordt de nieuwe verbinding 1,3-ethanopiperazine met de formule volgens figuur 1 bereid. Deze nieuwe stof is bruikbaar als anthelminticum omdat deze actief is tegen de helminten, die in het algemeen als rondwormen worden aangeduid. Gewoonlijk worden door deze helminten herkauwers besmet, zoals schapen, geiten en runderen, alsmede eenmagige dieren, zoals varkens en paarden. Het 1,3-ethano-

piperazine volgens de uitvinding alsmede de onderstaand beschreven alkyl- en acylderivaten hiervan zijn effectief bij het bestrijden van deze helminthen indien zij oraal aan de besmette dieren worden toege-
diend bij voorkeur in een dosering van 500 tot 1500 mg per kg lichaams-
gewicht.

5 Volgens de uitvinding worden verder alkyl- en acylderivaten van 1.3-ethanopiperazine bereid, welke verbindingen beantwoorden aan de formule volgens figuur 2, waarin R een alkylgroep, zoals een methyl-, ethyl-, propyl- en amylgroep, of een acylgroep, zoals een formyl-,
10 acetyl-, propionyl-, butyryl- en valeroyl- of benzoylgroep voorstelt. Deze 4-R 1.3-ethanopiperazinen zijn eveneens bruikbaar als anthelmintica.

Volgens de uitvinding werd een werkwijze gevonden voor het berei-
den van de bovengenoemde verbindin- en uit 2-(2-hydroxyethyl) pyrazine.
15 Eveneens heeft de uitvinding betrekking op de bereiding van nieuwe piperazineverbindingen, die bij een dergelijke synthese als tussenpro-
dukten bruikbaar zijn.

Volgens de uitvinding wordt het 1.3-ethanopiperazine en de 4-
alkyl- en 4-acylderivaten hiervan bereid volgens een werkwijze, die
20 kan worden toegelicht aan de hand van het reaktieschema van figuur 3, waarin X een halogeenatoom en bij voorkeur een chloor- of broomatoom
en R een alkyl- of acylgroep voorstellen. Het 1.3-ethanopiperazine
met de formule IV in het reaktieschema van figuur 3 kan eveneens wor-
den gedefinieerd als 1.4-diazabicyclo [3.2.1-octaan].

25 Volgens de eerste trap van de werkwijze volgens de uitvinding wordt het 2-(2-hydroxyethyl) piperazine bereid door katalytische re-
duktie van 2-(2-hydroxyethyl) pyrazine. Deze reductie wordt bij voor-
keur uitgevoerd in een geschikt oplosmiddelmilieu, zoals een alkanol,
bijvoorbeeld methanol, ethanol, butanol en dergelijke. Een oplossing
30 van het pyrazine wordt met waterstof behandeld bij aanwezigheid van
een geschikte hydrogeneringskatalysator. Voor dit doel verdient het
de voorkeur een edelmetalkatalysator te gebruiken, zoals platina of
palladium, hoewel Raney-nikkel eveneens geschikt is. Zeer goede resul-
taten zijn verkregen bij toepassing van platina-oxyde als hydrogenerings-
35 katalysator. De omzetting wordt gewoonlijk bij ongeveer kamertemperatuur
uitgevoerd onder een waterstofdruk van ongeveer 0,7 tot 3,5 kg/cm².

De omzetting wordt voortgezet, totdat de theoretische hoeveelheid waterstof is geabsorbeerd. Na afloop van deze periode wordt de katalysator verwijderd en wordt het gewenste 2-(2-hydroxyethyl) piperazine geïsoleerd door het oplosmiddelmilieu te verwijderen. Bij voorkeur wordt
5 het produkt omgezet in di-zuuradditiezouten, zoals het hydrochloride, hydrobromide en dergelijke, daar deze zouten sterker kristallijn zijn dan de vrije base.

Het 2-(2-hydroxyethyl) piperazine, dat op de bovenbeschreven wijze wordt verkregen, wordt volgens de tweede trap van de werkwijze volgens
10 de uitvinding omgezet in een 2-(2-halogeeneethyl) piperazine. Dit wordt uitgevoerd door het hydroxyethylpiperazine met een geschikt halogeneringsmiddel te halogeneren. Bij voorkeur wordt hiertoe een chlorerings- of bromeringsmiddel gebruikt, zodat men de chloorethyl- of broomethyl-
15 piperazineverbinding met de formule III in het reaktieschema van figuur 3 verkrijgt. Als geschikte halogeneringsmiddelen kunnen worden genoemd: Thionylchloride, fosfortrichloride, of -tribromide bij aanwezigheid van een amine, fosforoxychloride en chloorwaterstof/zinkchloride. De keuze van het bepaalde halogeneringsmiddel is niet overmatig kritisch, hoewel zeer bevredigende resultaten verkregen zijn onder toepassing van thionylchloride bij de bereiding van het 2-(2-chloorethyl)
20 piperazine uit de overeenkomstige hydroxyethylverbinding. Het 2-(2-broomethyl) piperazine kan op overeenkomstige wijze uit het hydroxyethylpiperazine worden bereid. Deze halogeeneethylpiperazineverbindingen worden bereid in de vorm van de di-zuuradditiezouten, namelijk het
25 di-hydrochloride of di-hydrobromide. Deze zouten zijn sterk kristallijne stoffen, die direkt bij de volgende trap van de werkwijze worden gebruikt.

Volgens de uitvinding werd verder gevonden, dat het 1.3-ethanopiperazine uit een 2-(2-halogeeneethyl) piperazine kan worden bereid
30 door de laatstgenoemde stof innig in aanraking te brengen met een base. De bepaalde base, die voor het uitvoeren van deze inwendige alkyleringsreaktie wordt gebruikt, is niet overmatig kritisch, zodat het mogelijk is een alkalimetaalhydroxyde, zoals natrium- of kaliumhydroxyde, een alkalimetaalcarbonaat, zoals natrium- of kaliumcarbonaat of
35 een organische base, zoals bijvoorbeeld pyridine, diethylamine en dergelijke, toe te passen. De alkylering verloopt bij kamertemperatuur bin-

nen korte tijd, waarna het gewenste 1.3-ethanopiperazine op geschikte wijze kan worden geïsoleerd door bij aanwezigheid van een kleine hoeveelheid base te destilleren. Het piperazine kan als zodanig worden geïsoleerd, terwijl het eveneens in een zuuradditiezout kan worden omgezet, zoals het dihydrochloride, dihydrobromide, sulfaat, nitraat, oxalaat, citraat en dergelijke.

Binnen het kader van de uitvinding vallen eveneens de 4-alkyl- en 4-acylderivaten van 1.3-ethanopiperazine. Van deze gesubstitueerde piperazinen verdienen de 4-alkyl- en 4-acylverbindingen de voorkeur, waarvan de alkylgroepen een relatief klein aantal koolstofatomen bevatten of waarvan de acylgroep afgeleid is van een alkaancarbonzuur met een klein aantal koolstofatomen of van benzoëzuur. De 4-acyl 1.3-ethanopiperazinen worden op eenvoudige wijze bereid door omzetting van het 1.3-ethanopiperazine met een geschikt acyleringsmiddel. Voor dit doel kan een zuurhalogenide, zoals een benzoylhalogenide, acetylhalogenide, propionylhalogenide en dergelijke of een alifatisch zuuranhydride bij aanwezigheid van een base, zoals pyridine, worden gebruikt. Op deze wijze verkrijgt men het 4-acetyl 1.3-ethanopiperazine, het 4-benzoyl 1.3-ethanopiperazine, het 4-propionyl 1.3-ethanopiperazine en het 4-butyroyl 1.3-ethanopiperazine.

De 4-alkylderivaten van 1.3-ethanopiperazine worden op eenvoudige wijze bereid door het 1.3-ethanopiperazine innig in aanraking te brengen met een alkyleringsmiddel, zoals methyljodide, ethyljodide, propylbromide, methylbromide en dergelijke. Deze omzetting wordt uitgevoerd bij aanwezigheid van een inert oplosmiddel, zoals aceton of methylethylketon. De gewenste 4-alkylverbinding kan uit het reactiemengsel volgens bekende methoden worden geïsoleerd.

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de volgende voorbeelden, die echter geen beperking inhouden.

30 VOORBEELD I

2-(2-hydroxyethyl) piperazine.

Men hydrogeneert 10 g 2-(2-hydroxyethyl) pyrazine in 150 cm³ methanol bij kamertemperatuur onder een waterstofdruk van 2,8 kg/cm² bij aanwezigheid van 2,5 g platinaoxyde. De berekende hoeveelheid waterstof is in verloop van 20 uren geabsorbeerd. Na het verwijderen van de katalysator door filtratie destilleert men het oplosmiddel in

vacuo af. Men verkrijgt het 2-(2-hydroxyethyl) piperazine als een lichtgele olie, die vast wordt maar olieachtig blijft. Een kleine hoeveelheid van deze vaste stof wordt met een overmaat chloorwaterstof in methanol behandeld. Hierbij slaat het 2-(2-hydroxyethyl) piperazine-dihydrochloride neer. Na het affiltreren en drogen vertoont deze stof een smeltpunt van ongeveer 210°C.

VOORBEELD II

2-(2-chloorethyl) piperazine-dihydrochloride.

Men koelt 20 g 2-(2-hydroxyethyl) piperazine in droogijs. Vervolgens voegt men onder afkoeling met droogijs teneinde de temperatuur beneden -40°C te houden thionylchloride toe in hoeveelheden van 3 cm³. Direct na het begin van het toevoegen van het thionylchloride vormt zich een vaste stof en wordt het roeren moeilijk. Na toevoeging van 15 cm³ thionylchloride is het reaktiemengsel praktisch vast. Men voegt in het totaal 100 cm³ thionylchloride toe, waarna men het mengsel gedurende 5½ uren op een stoombad onder terugvloeiakoeling kookt. Vervolgens koelt men de reaktiemassa tot ongeveer kamertemperatuur af, waarna men het vaste produkt door filtratie isoleert. Deze vaste stof wordt gedroogd, waarbij men het 2-(2-chloorethyl) piperazine-dihydrochloride verkrijgt, dat bij een temperatuur van 342°C smelt. Men lost deze stof in een minimale hoeveelheid water op, waarna men deze met aceton weer neerslaat, waarbij men de praktisch zuivere stof met een smeltpunt van 348 tot 350°C (onder ontleding) verkrijgt.

VOORBEELD III

1.3-ethanopiperazine.

Men suspendeert 60 g 2-(2-chloorethyl) piperazine-dihydrochloride in 45 cm³ water. Bij deze suspensie voegt men onder afkoeling een oplossing van 45 g natriumhydroxyde in 45 cm³ water. De verkregen oplossing wordt vijfmaal met telkens 250 cm³ chloroform geextraheerd, waarna men de chloroformextracten verenigt, op natriumsulfaat droogt en vervolgens in vacuo droogdamp, waarbij men een olie verkrijgt. Vervolgens voegt men bij het residu enige natriumhydroxydepillen, waarna men de olie onder een druk van 3 mm Hg bij een badtemperatuur beneden 100°C destilleert. Men vangt het 1.3-ethanopiperazine-destillaat op, dat bij kamertemperatuur vast wordt maar olieachtig blijft. Een gedeelte van dit produkt wordt in het dihydrochloridezout met een smeltpunt

van 348°C (onder ontleding) omgezet door het met een overmaat chloorwaterstof in methanol te behandelen.

VOORBEELD IV

4-benzoyl 1.3-ethanopiperazine.

5 Onder afkoeling behandelt men 0,5 g 1.3-ethanopiperazine in 3 cm³ van een 10% 's natriumhydroxydeoplossing met benzoylchloride in vijf hoeveelheden van telkens 0,2 cm³. De oplossing wordt alkalisch gehouden. De geur van het benzoylchloride verdwijnt, terwijl een volkomen oplossing wordt verkregen. Hierna extraheert men de oplossing driemaal met telkens 5 cm³ chloroform. De chloroformextracten worden verenigd 10 en op natriumsulfaat gedroogd. Vervolgens dampt men de chloroformoplossing in vacuo droog, waarbij men een stroop verkrijgt. Deze stroop lost men in een minimale hoeveelheid ether op. De etheroplossing wordt dan afgekoeld, waarbij het 4-benzoyl 1.3-ethanopiperazine uit- 15 kristalliseert. Het produkt wordt door filtratie geïsoleerd en uit ether herkristalliseerd, waarbij men de praktisch zuivere stof met een smeltpunt van 95 tot 97°C verkrijgt.

VOORBEELD V

4-methyl 1.3-ethanopiperazine

20 Bij een oplossing van 11,3 g 1.3-ethanopiperazine in 15 cm³ aceton voegt men langzaam onder roeren 14,2 g methyljodide. Het verkregen mengsel wordt 2 uren onder terugvloei-koeling gekookt, waarna men het in vacuo droogdamp. Het residu wordt dan in water opgelost en met een verdunde natriumhydroxydeoplossing alkalisch gemaakt. Vervol- 25 gens extraheert men de waterige oplossing vijfmaal met telkens 10 cm³ chloroform. De chloroformextracten worden verenigd, op natriumsulfaat gedroogd en in vacuo drooggedamp. Hierna destilleert men het op deze wijze verkregen residu in vacuo. De fraktie, die bij een temperatuur van 67 tot 70°C onder een druk van 20 mm Hg overkomt bestaat in hoofd- 30 zaak uit het 4-methyl 1.3-ethanopiperazine.

C O N C L U S I E S

1. Werkwijze voor het bereiden van heterocyclische stikstofverbindingen, met het kenmerk, dat men 1.3-ethanopiperazine bereidt door een 2-(2-halogeeneethyl) piperazine innig in aanraking te 35 brengen met een base en het verkregen 1.3-ethanopiperazine eventueel verder tot omzetting brengt.


2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men 2-(2-chloorethyl) piperazine innig in aanraking brengt met een alkalimetaalhydroxyde.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat men het 1.3-ethanopiperazine met een acyleringsmiddel of alkyl-
ringsmiddel omzet in een 4-acyl-, respectievelijk 4-alkyl 1.3-ethano-
piperazine.

4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat men 1.3-ethanopiperazine door behandeling met een verbinding met
de formule



omzet in een verbinding



waarbij R₁ een alkyl- of fenylgroep en X een halogeenatoom voorstellen.

5. Werkwijze voor het bereiden van heterocyclische stikstofverbindingen, met het kenmerk, dat men 2-(2-hydroxyethyl) piperazine met een halogeneringsmiddel omzet in een 2-(2-halogeenethyl) piperazine.

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat men 2-(2-hydroxyethyl) piperazine met thionylchloride omzet in het 2-(2-chloorethyl) piperazine.


7. Werkwijze voor het bereiden van heterocyclische stikstofverbindingen, met het kenmerk, dat men 2-(2-hydroxyethyl) pyrazine bij aanwezigheid van een hydrogeneringskatalysator hydrogeneert tot het 2-(2-hydroxyethyl) piperazine.

8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat men als hydrogeneringskatalysator een platinakatalysator gebruikt.

9. Werkwijze voor het bereiden van een therapeutisch actief of medicinaal preparaat, met het kenmerk, dat men als actieve stof een 1.3-ethanopiperazineverbinding of een zuuradditiezuur

hiervan gebruikt, welke verbinding in de vorm van de vrije base beantwoordt aan de formule

5



waarin R een waterstofatoom, een alkyl- of acylgroep voorstelt.

10

10. Gevormd farmaceutisch of medicinaal preparaat verkregen volgens de werkwijze van conclusie 9.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

